المركز الوطني لمكافحة الأمراض
إدارة الرصد والاستجابة السريعة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

Weekly Update:- Week 46 / 2020 (9 – 15 Nov.)

الموقف الوبائي لمرض كورونا COVID-19 في ليبيا

Week 45	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
	9	10	11	12	13	14	15
Cases (+)	970	875	919	824	0	974	722

إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Weekly Update: Weeks : 46 / 2020

❖ قراءة للموقف الوبائي لمرض (COVID 19) للحالات المؤكدة في ليبيا:

- ❖ **مجموع الحالات المؤكدة**: (74,324) حالة.
- ❖ **مجموع الحالات النشطة**: (28,566) حالة.
- ❖ **حالات شفيت**: (44,733) حالة.
- ❖ **مجموع الوفيّات**: (1,025) حالة.
- ❖ **معدل الشفاء**: (60.2 %).
- ❖ **معدل الحالات النشطة**: (38.43 %).
- ❖ **معدل الوفيات**: (1.38 %).
- ❖ **عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع**: (25,665) عينة.
- ❖ **الحالات الموجبة لهذا الأسبوع**: عدد (5,284) عينة موجبة.

منها عدد (3,328) حالة جديدة، عدد (1,956) حالة مخالطة.

- ❖ **معدل الحالات الموجبة مقارنة بعدد العينات لهذا الأسبوع**: (20.6 %).
- ❖ **أعلى حالات مبلغ عنها لهذا الأسبوع:**

الحالات الجديدة: عدد (2,017) حالة جديدة بمدينة طرابلس، عدد (123) حالة جديدة بمدينة الزاوية المركز، عدد (122) حالة جديدة بمدينة زليتن، عدد (105) حالة جديدة بمدينة جنزور.

الحالات المخالطة: عدد(800) حالة مخالطة بمدينة مصراتة، عدد (500) حالة مخالطة بمدينة طرابلس، عدد (120) حالة مخالطة بمدينة زليتن، عدد (114) حالة مخالطة بمدينة زوارة.

- ❖ **أعلى حالات مبلغ عنها حسب المدينة لهذا الأسبوع**:

عدد (2,517) حالة بمدينة طرابلس منها عدد (500) حالة مخالطة.

عدد (819) حالة بمدينة مصراتة منها عدد (800) حالة مخالطة.

عدد (242) حالة بمدينة زليتن منها عدد (120) حالات مخالطة.

عدد (172) حالة بمدينة الزاوية المركز منها عدد (49) حالة مخالطة.

❖ **حالات الشفاء لهذا الأسبوع** : (3,953) **حالة**.

المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
طرابلس	2778	الكفرة	6	زوارة	20
صرمان	87	العجيلات	27	الخمس	6
اجدابيا	5	الزاوية الجنوب	9	ترهونة	18
سبها	41	زليتن	76	القره بوللي	17
الرحيبات	26	الزنتان	35	خليج السدرة	2
غريان	45	الشويرف	1	القلعة	12
سرت	10	الزاوية المركز	85	قصر بن غشير	37
مصراتة	543	وازن	8	الزاوية الغرب	12
بني وليد	40	باطن الجبل	7		

❖ **معدل الشفاء لهذا الأسبوع**: (74.8 %).

❖ **حالات الوفاة لهذا الأسبوع**: **عدد** (81) **حالة**.

المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
طرابلس	13	الكفرة	3	غريان	3
زلطن	1	القلعة	2	صبراتة	2
العجيلات	5	الزاوية المركز	8	مصراتة	4
الخمس	4	قصر بن غشير	2	نسمة	1
باطن الجبل	1	جادو	1	رقدالين	2
اجدابيا	4	الزاوية الجنوب	1	الشاطئ	1
الرحيبات	1	بني وليد	1	الزاوية الغرب	3
مسلاتة	2	زليتن	4	ترهونة	2
صرمان	3	ظاهر الجبل	2	مسلاتة	1
صبراتة	1	زوارة	3		

❖ **معدل الوفاة لهذا الأسبوع**: (1.5 %).

❖ **أعلى نسب مئوية لعدد الحالات لهذا الأسبوع**:

مدينة طرابلس بنسبة (47.6%)، مدينة مصراتة بنسبة (15.5 %)، مدينة زليتن بنسبة (4.6 %)، مدينة الزاوية المركز بنسبة (3.3 %).

إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Weekly Update: Weeks : 46 / 2020








توزيع الحالات المؤكدة والحالات المخالطة للأسبوع 46
1200
1000
800
600
400
200
0
09-نوفمبر
10-نوفمبر
11-نوفمبر
12-نوفمبر
13-نوفمبر
14-نوفمبر
15-نوفمبر
الحالات المؤكدة
الحالات المخالطة


The Rate of Receiving Sample at the Community Health Reference Laboratory
of National Center for Disease Control (Week 46/2020)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع:

المدينة	عدد الحالات	النسبة المئوية	المدينة	عدد الحالات	النسبة المئوية
طرابلس	2517	47.634%	جادو	20	0.379%
بنغازي	130	2.460%	الزنتان	103	1.949%
جنزور	127	2.403%	الحرابة	7	0.132%
زليتن	242	4.580%	يفرن	12	0.227%
مصراتة	819	15.500%	قصر الأخيار	33	0.625%
ترهونة	42	0.795%	بني وليد	65	1.230%
مسلاتة	19	0.360%	الجفارة	22	0.416%
القره بوللي	54	1.022%	غدامس	2	0.038%
زوارة	125	2.366%	الزهرة	20	0.379%
سواني بن آدم	30	0.568%	ظاهر الجبل	8	0.151%
الرياينة	17	0.322%	مرزق	3	0.057%
سبها	26	0.492%	صرمان	50	0.946%
الغريفة	24	0.454%	طبرق	3	0.057%
الشاطئ	16	0.303%	الزاوية المركز	172	3.255%
بنت بيه	2	0.038%	القلعة	13	0.246%
تراغن	2	0.038%	الرحيبات	11	0.208%
البوانيس	1	0.019%	مزدة	12	0.227%
الكفرة	5	0.095%	درج	1	0.019%
المايا	37	0.700%	الرجبان	8	0.151%
الخمس	82	1.552%	باطن الجبل	7	0.132%
غريان	51	0.965%	كاباو	2	0.038%
سرت	26	0.492%	نالوت	4	0.076%
اجدابيا	17	0.322%	خليج السدرة	6	0.114%
سوق الخميس امسيحل	16	0.303%	السائح	3	0.057%
قصر بن غشير	57	1.079%	العواتة	3	0.057%
الزاوية الغرب	52	0.984%	صبراتة	29	0.549%
العجيلات	24	0.454%	الأصابعة	1	0.019%
الزاوية الجنوب	8	0.151%	نسمة	1	0.019%
السبيعة	5	0.095%	القريات	3	0.057%
رقدالين	15	0.284%	أم الأرانب	1	0.019%
الجميل	34	0.643%	العامرية	33	0.625%
المعمورة	4	0.076%			


Trend Cumulative number and confirmed cases of Libya COVID-19
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
week 13
week 14
week 15
week 16
week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22
week 23
week 24
week 25
week 26
week 27
Week 28
Week 29
Week 30
Week 31
Week 32
Week 33
Week 34
Week 35
Week 36
Week 37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41
Week 42
Week 43
Week 44
Week 45
Week 46
cumulative cases
confirmed cases


مخطط يوضح توزيع حالات كوفيد 19
%1
%39
%60
مجموع الحالات النشطة
مجموع حالات الشفاء
مجموع حالات الوفاة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA
تعريف حالة كوفيد- 19 لأغراض الترصد
(حسب منظمة الصحة العالمية)
ادارة الرصد والتقصي
والإستجابة السريعة

حالة يشتبه في أنها كوفيد-19 (تعريفان للحالة المشتبه فيها ألف وباء)

أ- شخص يستوفي المعايير السريرية والوبائية .

- المعايير السريرية :

1- بداية حادة للحمى والسعال

2- بداية حادة لأي ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية (حمى, سعال, ضعف عام/تعب , صداع , ألم عضلي , إلتهاب الحلق , زكام , ضيق تنفس , فقدان شهية / غثيان / ضيق , إسهال , تغيير الحالة العقلية) .

- المعايير الوبائية :

1. الإقامة أو العمل في منطقة تحتوي على مخاطر عالية لسريان الفيروس على سبيل المثال الأماكن السكنية المغلقة والبيئات الإنسانية , مثل المخيمات والبيئات الشبيهة بالمخيمات , والتي يقطنها المشردون . في أي وقت خلال فتر الأربعة عشر يوماً السابقة على بدء ظهور الأعراض .
2. الإقامة في منطقة حدث بها سريان مجتمعي أو السفر إليها في أي وقت خلال الأربعة عشر يوماً السابقة على بدء ظهور الأعراض .
3. العمل في بيئة صحية , بما في ذلك داخل المرافق الصحية وداخل الأسر المعيشية , في أي وقت خلال الأربعة عشر يوما السابقة على بدء ظهور الأعراض .

ب- مريض مصاب بإعتلال حاد وخيم بالجهاز التنفسي (عدوى تنفسية حادة مع تاريخ من الحمى أو حمى تتراوح بين $38^0 <$, وسعال مع بدء ظهور الأعراض في غضون العشر الأيام الماضية ويحتاج إلى دخول المستشفى)

ادارة الرصد والتقصي
والإستجابة السريعة

حالة كوفيد-19 محتملة :-

أ- مريض يستوفي المعايير السريرية أعلاه ومخالط لحالة محتملة أو مؤكدة , أو مرتبط وبائياً بتجمع من الحالات حيث حددت حالة واحدة على الأقل مؤكدة داخل ذلك التجمع .

ب- حالة مشتبه فيها (سبق وصفها أعلاه) حيث يبين تصوير الصدر نتائج توحي بالإصابة بمرضة كوفيد-19 .

✓ تشمل نتائج تصوير الصدر النموذجية التي توحي بالإصابة بكوفيد-19 مايلي :-

- التصوير الشعاعي للصدر: عتامة ضبابية , غالبا ما يتم تقريبها مورفولوجياً , موزعة على أجزاء الرئة الطرفية والسفلى .
- التصوير الشعاعي الطبقي بالحاسوب للصدر : عتامة زجاجية مستقرة ثنائية متعددة , غالبا ما يتم تقريبها مورفولوجياً , موزعة على أجزاء الرئة الطلافية والسفلى .
- تصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية : خطوط جنبة سميكة , خطوط الأشعة فوق البنفسجية باء (متعدد البؤر , أو منفصلة , أو تشابكية) أنماط مجمدة مع أو بدون صور القصبات الهوائية الظليلة .

ج- شخص بدأت تظهر عليه مؤخراً أعراض الخُشام (فقد الشم) أو فقد حاسة الذوق (فقد التذوق) في غياب أي سبب محدد أخر .

د- وفاة , ولا تفسير لها بشكل أخر , حدثت لدى بالغ أصيب بضائقة تنفسية قبل الوفاة وكان مخالط لحالة محتملة أو مؤكدة , أو مرتبطا وبائيا بتجمع حيث حددت حالة مؤكدة واحدة على الأقل داخل ذلك التجمع .

ادارة الرصد والتقصي والإستجابة السريعة

حالة كوفيد-19 مؤكدة :-

شخص تأكدت إصابته مختبريا بعدوى كوفيد-19 , بغض النظر عن الأعراض والعلامات السريرية .

تعريف المخالط :-

المخالط هو شخص تعرض لحالة محتملة أو مؤكدة خلال اليومين السابقين أو الأربعة عشر يوماً التالية لإصابتها بالأعراض .

1. مخالطة الحالة المحتملة أو المؤكدة وجها لوجه من مسافة متر واحد ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة .
2. الملامسة الجسمانية المباشرة للحالة المحتملة أو المؤكدة .
3. تقديم الرعاية المباشرة للمريض المصاب بالعدوى المحتملة أو المؤكدة بمرض كوفيد-19 دون استخدام معدات الحماية الشخصية الموصي بها .
4. الحالات الأخرى التي تشير إليها عمليات تقدير المخاطر المحلية .

تعريف حالة الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 :-

تعرف الوفاة بكوفيد-19 لأغراض الترصد بأنها وفاة ناجمة عن إعتلال متوافق سريريا في حالة إصابة محتملة أو مؤكدة بكوفيد-19 , ما لم يكن هنالك سبب بديل واضح للوفاة لا يمكن أن تكون له صلة بمرض كوفيد-19 , ويفترض أنه لا يوجد فترة للتعافي التام بين الإعتلال والوفاة .

ادارة الرصد والتقصي والإستجابة السريعة

Suspected COVID-19 case

A A person who meets the clinical **AND** epidemiological criteria:

Clinical Criteria:

- Acute onset of fever AND cough;

OR

- Acute onset of **ANY THREE OR MORE** of the following signs or symptoms: Fever, cough, general weakness/fatigue, headache, myalgia, sore throat, coryza, dyspnoea, anorexia/nausea/vomiting, diarrhoea, altered mental status.

AND

Epidemiological Criteria:

- Residing or working in an **area with high risk of transmission of virus:** closed residential settings, humanitarian settings such as camp and camp-like settings for displaced persons; anytime within the 14 days prior to symptom onset;

OR

- Residing or travel to an **area with community transmission** anytime within the 14 days prior to symptom onset;

OR

- Working in **any health care setting**, including within health facilities or within the community; any time within the 14 days prior of symptom onset.

B A patient with **severe acute respiratory illness** (SARI: acute respiratory infection with history of fever or measured fever of ≥ 38 C°; and cough; with onset within the last 10 days; and requires hospitalization).

ادارة الرصد والتقصي
والإستجابة السريعة

الصحة 89.1 fm



ملاحظة:

المصدر صفحة **المركز الوطني لمكافحة الأمراض_ليبيا** على موقع الفيس بوك.